



# Mathematik

Thema 3

## Integralrechnung

# Überblick

## **Thema:** Integralrechnung

Inhalte	Buch
Stammfunktionen	4.1
Einfache Integrationsregeln	4.2
Anwendungen	4.3

Integralrechnung

# Stammfunktionen

# Stammfunktionen

## Definition 4.1: Stammfunktion

Es sei  $F(x)$  eine differenzierbare Funktion und es sei  $f(x) = F'(x)$  ihre Ableitung. Dann nennt man  $F$  eine **Stammfunktion** von  $f$ .

## Beispiel 4.2

$F(x) = x^2$  ist eine Stammfunktion von  $f(x) = 2x$ .

Aber auch  $G(x) = x^2 + 3$  ist eine Stammfunktion von  $f(x) = 2x$ .

# Stammfunktionen

## Satz 4.3

Sind  $F(x)$  und  $G(x)$  zwei Stammfunktionen ein- und derselben Funktion  $f(x)$ , dann unterscheiden sich  $F$  und  $G$  nur um eine additive Konstante, d.h.  $F(x) = G(x) + C$ .

### Begründung:

$$F'(x) = G'(x) \implies F'(x) - G'(x) = 0$$

Das bedeutet:  $F(x) - G(x)$  muss **konstant** sein, denn die Ableitung einer Konstanten ist Null.

# Stammfunktionen

## Bestimmtes Integral

Es sei  $f(x)$  eine Funktion, die eine Stammfunktion  $F(x)$  besitzt und es seien  $a, b \in \mathbb{R}$ . Dann nennt man

$$\int_a^b f(x) dx := F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$$

das **bestimmte Integral** von  $f$  zwischen den Grenzen  $a$  und  $b$ .

Wenn Integrationsgrenzen **vertauscht** werden, ändert sich das Vorzeichen:

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

Schreibweise für das **unbestimmte Integral**:

$$\int f(x) dx := F(x) + C$$

# Stammfunktionen

**Bemerkung:** Für das bestimmte Integral ist die Wahl der Konstante  $C$  in der Stammfunktion irrelevant, denn für eine Stammfunktion  $G(x) = F(x) + C$  gilt:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) \, dx &= G(b) - G(a) \\ &= (F(b) + C) - (F(a) + C) \\ &= F(b) - F(a)\end{aligned}$$

Daher wird häufig auch beim unbestimmten Integral die Konstante  $C$  weggelassen.

Integralrechnung

# Einfache Integrationsregeln

# Integrationsregeln

## Satz 4.7: Potenzen

Es sei  $\alpha \neq -1$ , dann gilt:

$$(x^{\alpha+1})' = (\alpha + 1)x^\alpha \quad \Rightarrow \quad \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha + 1} + C$$

## Musteraufgabe 4.8

Man bestimme eine Stammfunktion von  $f(x) = x^5$  und berechne  $\int_{-2}^3 x^5 dx$ .

**Lösung:**  $F(x) = \int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C$

$$\int_{-2}^3 x^5 dx = \left( \frac{x^6}{6} \right) \Big|_{-2}^3 = \frac{3^6}{6} - \frac{(-2)^6}{6} = \frac{665}{6} = 110.833$$

# Integrationsregeln

## Musteraufgabe 4.9

- Man bestimme eine Stammfunktion von  $g(u) = \frac{1}{\sqrt{u}}$
- Man berechne  $\int_1^{10} \frac{1}{\sqrt{u}} du$ .

**Lösung:**

$$F(u) = \int \frac{1}{\sqrt{u}} du = \int u^{-1/2} du = 2u^{1/2} + C = 2\sqrt{u} + C$$

$$\int_1^{10} \frac{1}{\sqrt{u}} du = 2\sqrt{u} \Big|_1^{10} = 2\sqrt{10} - 2\sqrt{1} = 4.325$$

# Integrationsregeln

## Satz 4.10: Summensatz

$$\int [af(x) + bg(x)] dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx$$

## Musteraufgabe 4.11

- Man bestimme eine Stammfunktion von  $f(x) = 3x^2 - 5 + \frac{1}{x^3}$ .
- Man berechne  $\int_3^7 f(x) dx$ .

$$F(x) = \int \left( 3x^2 - 5 + \frac{1}{x^3} \right) dx = x^3 - 5x - \frac{1}{2x^2} + C$$

$$\int_3^7 \left( 3x^2 - 5 + \frac{1}{x^3} \right) dx = \left( x^3 - 5x - \frac{1}{2x^2} \right) \Big|_3^7 = 296.045$$

# Integrationsregeln

## Satz 4.12: Exponentialfunktion und Logarithmus

Für **Exponentialfunktion** und **Logarithmus** gilt:

$$(e^x)' = e^x \quad \Longrightarrow \quad \int e^x dx = e^x + C$$

$$\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad \Longrightarrow \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln x + C, \quad x > 0$$

$$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln(ax+b) + C$$

# Integrationsregeln

## Musteraufgabe 4.20

- Man bestimme eine Stammfunktion von  $f(x) = e^{-2x+3}$
- Man berechne  $\int_1^5 e^{-2x+3} dx$

### Lösung:

$$\int e^{-2x+3} dx = -\frac{1}{2}e^{-2x+3} + C$$
$$\int_1^5 e^{-2x+3} dx = -\frac{1}{2}e^{-2x+3} \Big|_1^5 = -\frac{1}{2}e^{-7} + \frac{1}{2}e^1 = 1.3587$$

# Integrationsregeln

## **Musteraufgabe 4.21**

Man berechne  $\int_1^2 \frac{1}{2x+1} dx$

**Lösung:**


$$\int \frac{1}{2x+1} dx = \frac{1}{2} \ln(2x+1) + C$$

$$\int_1^2 \frac{1}{2x+1} dx = \frac{1}{2} \ln(2x+1) \Big|_1^2 = \frac{1}{2} \ln 5 - \frac{1}{2} \ln 3 = 0.2554$$

Integralrechnung

# Anwendungen

# Anwendungen der Integralrechnung



# Anwendungen der Integralrechnung

## Flächeninhalte

Es sei  $f(x)$  eine Funktion und  $A(x)$  der **Flächeninhalt** unter dem Graphen der Funktion entlang des Intervalls  $[0, x]$ . Dann ist

$$A(x + h) - A(x) \approx f(x)h$$

und für  $h \rightarrow 0$  folgt  $A'(x) = f(x)$ .

Der Flächeninhalt  $A(x)$  ist also eine Stammfunktion von  $f(x)$ .

$$A(b) - A(a) = \int_a^b f(x) dx$$

# Anwendungen der Integralrechnung


## **Musteraufgabe 4.25**

Man berechne den Flächeninhalt unter der Funktion  $f(x) = e^{-2x}$  zwischen den Grenzen  $x = 0$  und  $x = 10$ .

**Lösung:**

$$\int_0^{10} e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} e^{-2x} \Big|_0^{10} = -\frac{1}{2} e^{-20} + \frac{1}{2} = 0.5000$$

# Anwendungen der Integralrechnung



# Anwendungen der Integralrechnung

## Durchschnittswert

Der Durchschnittswert  $\bar{f}$  einer Funktion  $f$  auf einem Intervall  $[a, b]$  ist die **Höhe eines Rechtecks**, das den gleichen Flächeninhalt einschließt wie der Funktionsgraph.

$$(b - a)\bar{f} = \int_a^b f(x) \, dx \quad \Longrightarrow \quad \bar{f} = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) \, dx$$

# Anwendungen der Integralrechnung

## **Musteraufgabe 4.26**

- Berechne den Durchschnittswert von  $f(x) = x$  auf dem Intervall  $[0, 5]$ .
- Berechne den Durchschnittswert von  $f(x) = e^{-x}$  auf dem Intervall  $[0, 5]$ .

### **Lösung:**

$$\frac{1}{5} \int_0^5 x \, dx = \frac{1}{5} \frac{x^2}{2} \Big|_0^5 = 2.5$$

$$\frac{1}{5} \int_0^5 e^{-x} \, dx = -\frac{e^{-x}}{5} \Big|_0^5 = \frac{1 - e^{-5}}{5} = 0.1987$$

# Anwendungen der Integralrechnung

## **Musteraufgabe – Grenzkosten**

Ein Unternehmen produziert den Output  $x$  mit folgenden Grenzkosten:

$$C'(x) = 3x^2 - 6x + 14.$$

Bei einem Output von 10 Einheiten betragen die Kosten  $C(10) = 2840$  GE.  
Wie hoch sind die Kosten bei einem Output von 20 Einheiten?

**Lösung:** Bildung der Stammfunktion der Grenzkostenfunktion.

$$\begin{aligned} C(x) &= \int C'(x) \, dx \\ &= \int 3x^2 - 6x + 14 \, dx \\ &= x^3 - 3 \cdot x^2 + 14 \cdot x + c \end{aligned}$$

# Anwendungen der Integralrechnung

Bestimmung der Konstante  $c$  (Fixkosten) durch Einsetzen der Angabe.

$$\begin{aligned}2840 &= C(10) \\ &= 10^3 - 3 \cdot 10^2 + 14 \cdot 10 + c \\ &= 840 + c \\ 2000 &= c\end{aligned}$$

Gesuchte Kosten:

$$\begin{aligned}C(20) &= 20^3 - 3 \cdot 20^2 + 14 \cdot 20 + 2000 \\ &= 9080\end{aligned}$$